

5g/Hectare
GREEN BULL ONE
Meststof

STAP 1

DE BODEM VOORBEREIDEN

CONVENTIONELE MESTSTOF:

Universiteitsstudies en veldresultaten geven aan dat het gebruik van conventionele meststoffen met maximaal 75% kan worden verminderd wanneer het samen met Green Bull One wordt gebruikt. Het verminderingsniveau hangt af van bodemcondities, waterbeschikbaarheid, klimaat, gewastype en landbouwpraktijken, en kan in de loop van de tijd verder verbeteren naarmate bodemcondities en nutriëntenefficiëntie zich ontwikkelen.

BASISMENGSEL (afhankelijk van de bodemkwaliteit):

Hoe te mixen

Gebruik **1 tablet gemengd met 20 liter water = 480m²**.

Gebruik **25 tabletten** gemengd met **600-800 liter** water = 1 hectare.

Gebruik **1 lepel poeder (0,125 g)** gemengd met **20 liter** water = 250 m².

Gebruik **40 lepels poeder (5,0g)** gemengd met **600-800 liter** water = 1 hectare.

WAARSCHUWING:

Het mengen van Green Bull One met andere meststoffen, enzovoort, vermindert de effectiviteit.

Methode:

Gebruik een zeer **grote nozzle** en spray met een rugzakspuit, de tractor met een spuittank of drone en breng aan met een **sterke sprayspray**



ALGEMENE STAP:

DE ZADEN IN ONZE MESTSTOF LATEN SWEARKEN:

KIEMING:

Korte zaadweken verbetert de kieming, ondersteunt de vroege wortelontwikkeling en bevordert een uniforme veldopkomst.

WEEKSCHEMA:

De vereiste weektijd varieert per gewas en moet beperkt en nuttig blijven voor standaard zaaimachines.

ZAAIEN:

Zorg ervoor dat je niet te lang laat weken, zodat de zaden hun volledige vloeibaarheid behouden en gebruikt kunnen worden met standaard mechanische en pneumatische zaaiapparaten.

5g/Hectare
GREEN BULL ONE ▶
Meststof

STAP 2

TOEPASSINGSFASE NA HET VERSCHIJNEN VAN DE EERSTE BLADEREN:

MENG- EN SPUITSHEMA:

Volgens de instructies in de onderstaande tabel (Klik op de knop)

Hoe te mixen

OPMERKING:

Je hebt geen extra conventionele meststoffen nodig zodra de eerste bladeren verschijnen.

BESTRIJDINGSMIDDELEN:

Indien nodig kun je niet-giftige pesticiden gebruiken. Deze mogen pas twee dagen na de laatste aanwending van onze meststof worden aangebracht.

WAARSCHUWING:

Het mengen van Green Bull One met andere meststoffen, enzovoort, vermindert de effectiviteit.

METHODE:

Gebruik een heel **fijne nozzle** en spray met een rugzakspuit, de tractor met een spuittank of drone en breng aan met een nevelspray

5g/Hectare
GREEN BULL ONE ▶
Meststof

STAP 3

TOEPASSINGSFASE:

MONITORING:

Controleer de plantengroei, bodemvocht en pH regelmatig tijdens elke fase om zeker te zijn dat de behandeling goed werkt.

MENG- EN SPUITSHEMA:

Volgens de instructies in de onderstaande tabel (Klik op de knop)

Hoe te mixen

OPMERKING:

Je hebt geen extra conventionele meststoffen nodig zodra de eerste bladeren verschijnen.

BESTRIJDINGSMIDDELEN:

Indien nodig kun je niet-giftige pesticiden gebruiken. Deze mogen pas twee dagen na de laatste aanwending van onze meststof worden aangebracht.

WAARSCHUWING:

Het mengen van Green Bull One met andere meststoffen, enzovoort, vermindert de effectiviteit.

METHODE:

Gebruik een heel **fijne spuit** en spray met een rugzakspuit, een tractor met een spuittank of drone en breng aan met een nevelspray.



5g/Hectare
GREEN BULL ONE ▶
Meststof

STAP 4

TOEPASSINGSFASE:

Controleer je planten en de pH-waarde van de bodem.

MENG- EN SPUITSHEMA:

Volgens de instructies in de onderstaande tabel (Klik op de knop)

Hoe te mixen

OPMERKING:

Je hebt geen extra conventionele meststoffen nodig zodra de eerste bladeren verschijnen.

Pesticiden:

Indien nodig kun je niet-giftige pesticiden gebruiken. Deze mogen pas twee dagen na de laatste aanwending van onze meststof worden aangebracht.

WAARSCHUWING:

Het mengen van Green Bull One met andere meststoffen, enzovoort, vermindert de effectiviteit.

Methode:

Gebruik een heel **fijne spuit** en spray met een rugzakspuit, een tractor met een spuittank of drone en breng aan met een nevelspray.

HOE GEBRUIK JE ARGOTECH-BEHANDELING:

De informatie in deze richtlijnen kan verschillen afhankelijk van de
landspecifiek klimaat en gewassen.

In het geval van extreme klimatologische omstandigheden enzovoort, stuur ons dan de
relevante informatie.

Dit omvat de volgende informatie:

- Toestand van de bodem
- Luchtvochtigheid
- Waterkwaliteit
- Bestaande waterreservoirs (meer, rivier, enz.)
- Regenperiodes
- Laatste oogsthoeveelheid en kwaliteit
- Andere problemen

Categorie	Podium	Beschrijving	Mix (tablet)	Mix (poeder)	Spuitschema
Bodemvoor bereiding 	Voor het - planten	Spuit de grond één keer bij het begin van het planten om de bodemomstandi- gheden voor te bereiden	1 tablet / 20L (480m ²) 25 tabletten / 600-800L (1ha)	1 lepel 0,125g / 20L (250m ²) 5g / 600- 800L (1Ha)	Eens
Rijst & Graan 	Zatebra-dine	Week zaden voor het planten om de kieming te verbeteren en te bereiken. Volg Instructiepagina 2	1 tablet / 20L (480m ²) 25 tabletten / 600-800L (1ha)	1 lepel 0,125g / 20L (250m ²) 5g / 600- 800L (1Ha)	De vereiste weektijd varieert per gewas en moet beperkt en nuttig blijven voor standaard zaaimachines.

Categorie	Podium	Beschrijving	Mix (tablet)	Mix (poeder)	Spuitschema
-----------	--------	--------------	--------------	--------------	-------------

Rijst & Graan 	Groeicyclus	Spuiten moet worden vermeden wanneer rijst bestuift (bloeiperiode), omdat spuiten het bestuiving-sproces verstoort. Efficiency Booster draagt bij aan een goede wortelvorming en sterker, wat resulteert in sterke stengels, rechtopstaande bladeren, lange peulen en een goed gewicht.	1 tablet / 20L (480m²) 25 tabletten / 600-800L (1Ha)	1 lepel 0,125g / 20L (250m²) 5g / 600-800L (1Ha)	1e spray: Bij het zaaien zijn 20 tot 30 dagen oud. 2e spray: Wanneer zaaingen klonten beginnen te vormen bij 45 - 50 dagen. 3e spray: Wanneer de rijst begint te schiven 60 - 75 dagen. 4e spray: Wanneer rijstvezels ongeveer rijstvezels rijp zijn 90 dagen.
Rubberboom 	Alle fasen	Bevordert de groei van bladeren en stamcellen. Solliciteer naar verse cellen.	1 tablet / 20L (480m²) 25 tabletten / 600-800L (1Ha)	1 lepel 0,125g / 20L (250m²) 5g / 600-800L (1Ha)	Elke 10-15 dagen of op langere intervallen als de zaaingen overwoekerd zijn. Grote boom – 1 jaar en ouder: Spray elke 10 – 15 dagen om het verse blad of de stamcellen te bereiken. Kleine boom: Gebruik dezelfde methode en spray gelijkmatig 10 – 15 dagen. Hoge boom: Gebruik dezelfde methode voor het spuiten van de stammen/basissen van de boom; de rubberboom kan 10 tot 15 dagen worden bespoten.

Categorie	Podium	Beschrijving	Mix (tablet)	Mix (poeder)	Spuitschema
Palmboom 	Alle fasen	Supports Gestaag groeien. Spray zachtjes en gelijkmatig.	1 tablet / 20L (480m ²) 25 tabletten / 600-800L (1Ha)	1 lepel 0,125g / 20L (250m ²) 5g / 600- 800L (1Ha)	Spuitschema: Spray lichtjes en gelijkmatig elke 10 tot 15 dagen op langere intervallen als je bang bent dat het zaad overwoekerd raakt. Palmboom – 1 jaar en ouder: Gebruik dezelfde methode en spray elke 10 – 15 dagen; het spuiten van verse bladeren of stengels op de stam van de palmboom zou geweldig zijn. Kleine bomen: Gebruik dezelfde mix en methode en spray gelijkmatig. Hoge bomen: Gebruik dezelfde verhouding en methode voor het besproeien van de stammen/voeten van de bomen

Categorie	Podium	Beschrijving	Mix (tablet)		Spuitschema
Veldgewassen 	Na het planten	Verbeterd de kieming en groei. Kan gecombineerd worden met andere behandelingen.	1 tablet / 20L (480m ²) 25 tabletten / 600-800L (1Ha)	1 lepel 0,125g / 20L (250m ²) 5g / 600-800L (1Ha)	Na het planten: Begin 1 week na het planten met spuiten , samen met het spuiten van andere stoffen die door boeren worden gebruikt, spuit elke 15 – 20 dagen .
Grote bomen en vruchten 	Alle fasen		1 tablet / 40L (480m ²) 25 tabletten / 600-800L (1Ha)	1 lepel 0,125g / 40L (250m ²) 5g / 600-800L (1Ha)	Grote boom vanaf 1 jaar: Gebruik dezelfde mix en methode en spray elke 10 – 15 dagen om het verse blad of de stamcellen te bereiken. Kleine bomen: Gebruik dezelfde mix en methode en spray gelijkmatig. Hoge bomen: Gebruik hetzelfde mengsel en spray dezelfde verhouding en methode voor het spuiten van de stammen/voeten van de bomen.
Bladgroenten en moestuinen, chili, aubergines, luffa-kalebas, lange bonen, soja en komkommers, enzovoort. 	Alle fasen	Ondersteunt de bladdichtheid en plantsterkte. Pas het aan op basis van de conditie van de plant.	1 tablet / 40L (480m ²) 25 tabletten / 600-800L (1Ha)	1 lepel 0,125g / 40L (250m ²) 5g / 600-800L (1Ha)	Spray gelijkmatig elke 7 – 10 dagen of 1 tot 2 dagen voor en na het oogsten door de dikte van de bladeren van de plant te observeren, de bodemdichtheid of spray wanneer het uitkomt.

Categorie	Podium	Beschrijving	Mix (tablet)	Mix (poeder)	Spuitschema
Paddenstoelen 	Bloeien	Breng het aan nadat de paddenstoelen beginnen te vormen. Ondersteunt de groeicyclus.	1 tablet / 80L (480m ²) 25 tabletten / 600-800L (1Ha)	1 lepel 0,125g / 80L (250m ²) 5g / 600-800L (1Ha)	Spray elke 5 tot 7 dagen nadat de paddenstoelen zijn begonnen met bloeien
Bloeiende planten 	Alle fasen		1 tablet / 40L (480m ²) 25 tabletten / 1200-1600L (1Ha)	1 lepel 0,125g / 40L (250m ²) 5g / 1200-1600L (1Ha)	Spray gelijkmatig elke 7 – 10 dagen of 1-2 dagen na oogst om de planten te voeden of te herstellen.
Banaan  	Bananen-scheuten planten	Vruchtvorming van bananen: Bananen bloeien op verschillende leeftijden, afhankelijk van het type banaan, bijvoorbeeld: Lady finger Banan begint rond de 5-6 maanden te bloeien. Gros Michel-banaan begint rond de 6-7 maanden te bloeien. Ducasse Banana en Silver Bluggoe Banaa doen langer over en de vruchten rijpen op verschillende momenten.	2 tablets / 20L (480m ²) 25 tabletten / 600-800L (1Ha)	2 lepels 0,125g / 20L (250m ²) 5g / 600-800L (1Ha)	Spuut na het planten, daarna elke 10 dagen tot je 1 maand oud bent

Categorie	Podium	Beschrijving	Mix (tablet)	Mix (poeder)	Spuitschema
Banaan 	Bananenboom van 1 maand oud (Bananenklonten)	Spuitsblad en basis van bananenklonten tijdens vegetatieve groei			Spuits elke 15 dagen blad en basis van de banaan tot hij 4 maanden oud is
Banaan 	Bananenboom 4 – 5 maanden, groeit snel (Bananenbloesem begint te verschijnen)	Snelle groeifase; Ga door met het aanbrengen van bladeren en basis.	2 tablets / 20L (480m ²) 25 tabletten / 600-800L (1ha)	2 lepels 0,125g / 20L (250m ²) 5g / 600-800L (1Ha)	Spuits elke 15 dagen blad en basis van de banaan
Banaan 	Bananenboom 5-6 maanden, bananenbloesem begint vruchten te dragen	Blijf bladeren en basis besproeien tijdens de vroege vruchtzetting.			Spuitsblad en basis van de banaan elk 30 dagen
Banaan 	Bananenboom 7-8 maanden, voor oogst	Houd blad- en basisbesproeiing tijdens de vruchtontwikkeling tot de oogst.			Spuitsblad en basis van de banaan elk 30 dagen
Categorie	Podium	Beschrijving	Mix (tablet)	Mix (poeder)	Spuitschema
Cacao 	Na het planten (~15 dagen)	Ondersteunt vroege ontwikkeling na het planten.	1 tablet / 40L (480m ²) 25 tabletten / 600-800L (1ha)	1 lepel 0,125g / 20L (250m ²) 5g / 600-800L (1Ha)	Spuitsblad en basis van de boom 7 dagen per stuk

Cacao	12–18 maanden	Behoud een gestage groei; Spuitblad en basis.	Spuitblad en basis van de boom elk 15 dagen
Cacao	2 jaar en ouder	Blijf regelmatig onderhoudsspuiten voor gevestigde bomen.	Spuitblad en basis van de boom elk 15 dagen